

竹類に登録拡大!

※竹類とはマダケ・モウソウダケなどあらゆる竹です

竹類・ササ類を枯らす!



除草剤

処理方法



ドリル(ナタ)などで穴をあける。



地上から
30~100cm

注入後、ガムテープなどで穴をふさぐ。



原液を**10ml** 注入

竹の葉が、すべて落ちれば
(完全落葉)根まで枯れます!



2~5ヶ月後

処理時期

もっとも早く枯れる時期
夏期
(6~8月)

竹の防除法については、下記にお電話下さい。
サンフーロン お客様相談窓口
フリーダイヤル **0120-014-052**
サンフーロン ホームページ
<http://www.taiseinozai.co.jp/surfulon/>



・ササ類は…
夏期~秋期に
30倍液で
ていねいに
葉っぱに散布。



成分:グリホサート
イソプロピルアミン塩 41%

農林水産省登録 第18814号

葉から入って 根まで枯らす 除草剤

サンフーロン

適用の範囲及び使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	5~10ml/本	1回	竹稈 注入処理	1回

注意事項: 処理竹から15m以内に発生したたけのこを食用に供さないこと。また、縄囲いや立て札により、たけのこが採取されないようにすること。